



Reporte General Encuesta


Arsenal terapéutico de esclerosis múltiple Infección con SARS-COV-2



LACTRIMS
LATIN AMERICAN COMMITTEE FOR TREATMENT
AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS


P6 País

Respondidas: 35 Omitidas: 0



P7 ¿Alguno de sus pacientes ha tenido una recaída o ataque agudo de EM entre febrero 2020 hasta la fecha?


Respondidas: 33 Omitidas: 2



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
No (SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA PASE DIRECTAMENTE A LA PREGUNTA 14)	63.64%	21
Sí	0.00%	0
Sí, indique fecha del evento (favor usar este formato: dd/mm/aaaa)	36.36%	12
TOTAL		33

P9 ¿Estaba su paciente enfermo con Coronavirus?


Respondidas: 10 Omitidas: 25



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Si, solo sospechado clínicamente	0.00% 0
Si, confirmado con Prueba	10.00% 1
No	90.00% 9
TOTAL	10

P10 ¿Requirió de manejo en terapia intensiva?


Respondidas: 10 Omitidas: 25



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
No aplica	20.00% 2
Si	0.00% 0
No	80.00% 8
TOTAL	10

P11 ¿ Empeoró su paciente clínicamente después de la recaída desde el punto de vista respiratorio/pulmonar?


Respondidas: 11 Omitidas: 24



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
No aplica	27.27%	3
Sí	0.00%	0
No	72.73%	8
TOTAL		11

P12 ¿Que tratamiento fue utilizado?


Respondidas: 11 Omitidas: 24



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
No aplica	18.18%	2
Corticoesteroides IV	63.64%	7
Corticoesteroides orales	0.00%	0
Corticoesteroides IV y orales	0.00%	0
Ningún tratamiento	18.18%	2
Otro medicamento (especifique)	0.00%	0
TOTAL		11

P13 ¿Cuál es su estado actual?


Respondidas: 11 Omitidas: 24



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	Cantidad
No aplica	36.36%	4
Falleció	0.00%	0
Desconocido	9.09%	1
Se recuperó de la infección	27.27%	3
Otro (especifique)	27.27%	3
TOTAL		11

P14 RIESGO MUY BAJO Interferones, Acetato de Glatirámero, Teriflunomida


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	0.00% 0
Continúa tratamiento	93.75% 30
Suspende temporalmente dependiendo de casos de COVID en la comunidad	3.13% 1
Individualiza cada caso	6.25% 2
Total de encuestados: 32	

P15 RIESGO BAJO Anticuerpos Monoclonales anti-CD20


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	9.38% 3
Continúa tratamiento	43.75% 14
Suspende temporalmente dependiendo de casos de COVID en la comunidad	25.00% 8
Individualiza cada caso	34.38% 11
Total de encuestados: 32	

P16 RIESGO MEDIO Fumaratos Natalizumab


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	9.38% 3
Continúa tratamiento	59.38% 19
Depende de la situación local	9.38% 3
Individualiza cada caso	31.25% 10
Total de encuestados: 32	

P17 RIESGO MEDIO-ALTO Fingolimoides


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	9.38% 3
Continúa tratamiento	37.50% 12
Depende de la situación local	9.38% 3
Individualiza cada caso	50.00% 16
Total de encuestados: 32	

P18 RIESGO ALTO Cladribina Alemtuzumab Mitoxantrone Trasplante de Células Madres


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	50.00% 16
Continúa tratamiento	0.00% 0
Depende de la situación local	12.50% 4
Individualiza cada caso	43.75% 14
Total de encuestados: 32	

P19 ¿CUÁNTOS CASOS DE COVID-19 CON EM TIENE BAJO SU CUIDADO? EN CASO NEGATIVO, marque NO TENGO PACIENTES INFECTADOS CON COVID-19, SI ESTE ES EL CASO CONTESTE LAS PREGUNTAS SUBSIGUIENTES DE COMO MANEJARÍA ESE ESCENARIO DE ACUERDO A SU CRITERIO, AUNQUE SEA UNA RESPUESTA TEÓRICA (estamos estudiando utilización de criterios)


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
NO TENGO PACIENTES INFECTADOS CON COVID-19	75.00% 24
Cantidad de pacientes infectados	25.00% 8
Total de encuestados: 32	

P20 RIESGO MUY BAJO Interferones, Acetato de Glatirámero, Teriflunomida


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
Suspende tratamiento	0.00%	0
Continúa tratamiento	93.75%	30
Suspende temporalmente dependiendo de casos de COVID en la comunidad	9.38%	3
Individualiza cada caso	6.25%	2
Total de encuestados: 32		

P21 RIESGO BAJO Anticuerpos Monoclonales anti-CD20


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	18.75% 6
Continúa tratamiento	21.88% 7
Suspende temporalmente dependiendo de casos de COVID en la comunidad	28.13% 9
Individualiza cada caso	43.75% 14
Total de encuestados: 32	

P22 RIESGO MEDIO Fumaratos Natalizumab


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	21.88% 7
Continúa tratamiento	31.25% 10
Depende de la situación local	9.38% 3
Individualiza cada caso	46.88% 15
Total de encuestados: 32	

P23 RIESGO MEDIO-ALTO Fingolimoides


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	21.88% 7
Continúa tratamiento	25.00% 8
Depende de la situación local	9.38% 3
Individualiza cada caso	53.13% 17
Total de encuestados: 32	

P24 RIESGO ALTO Cladribina Alemtuzumab Mitoxantrone Trasplante de Células Madres


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Suspende tratamiento	75.00% 24
Continúa tratamiento	3.13% 1
Depende de la situación local	6.25% 2
Individualiza cada caso	18.75% 6
Total de encuestados: 32	

P25 RIESGO MUY BAJO


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
Interferón β 1-a IM	81.25%	26
Interferón β SC	75.00%	24
Interferón β 1-b SC	81.25%	26
Glatiramoides	84.38%	27
Teriflunomida	53.13%	17
Total de encuestados: 32		

P26 RIESGO BAJO


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Ocrelizumab	84.38% 27
Rituximab	68.75% 22
Total de encuestados: 32	

P27 RIESGO MEDIO


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Fumaratos	68.75% 22
Natalizumab	84.38% 27
Total de encuestados: 32	

P28 RIESGO MEDIO-ALTO


Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
Fingolimoides	96.88%	31
Ocrelizumab	0.00%	0
Rituximab	0.00%	0
Otro (especifique)	6.25%	2
Total de encuestados: 32		

P29 RIESGO ALTO

Respondidas: 32 Omitidas: 3



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS
Cladribina	68.75% 22
Alemtuzumab	81.25% 26
Mitoxantrone	53.13% 17
Trasplante de Células Madre	46.88% 15
Total de encuestados: 32	